



СИОФОР®

МЕТФОРМИНА
ГИДРОХЛОРИД 500, 850, 1000 мг

КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ИНСУЛИНО- РЕЗИСТЕНТНОСТИ^{1,2}

ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
И ПРЕДИАБЕТЕ¹

- ▶ В моно- и комбинированной терапии сахарного диабета 2 типа у взрослых и детей с 10 лет¹
- ▶ Не стимулирует секрецию инсулина и не приводит к гипогликемии^{1*}
- ▶ Благоприятно воздействует на липидный обмен¹



Препарат
выбора² № 1^{**}

1. Общая характеристика лекарственного препарата Сιοфор® 500, Сιοфор® 850, Сιοфор® 1000.

2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и соавт. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 11-й выпуск. Сахарный диабет. 2023;26(25):1-157. <https://doi.org/10.14341/DM13042>

* В монотерапии. ** У пациентов с хронической болезнью почек или сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска рекомендуется персонализированный подход.

Базовая информация о препарате Сιοфор® 500/850/1000 от 11.07.2024:

Действующее вещество: метформин (в виде гидрохлорида), в дозе 500 мг, 850 мг и 1000 мг. **Показания к применению:** сахарный диабет 2 типа, особенно у пациентов с избыточной массой тела, для адекватного контроля концентрации глюкозы в плазме крови при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок; у взрослых в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с другими пероральными гипогликемическими средствами и инсулином; у детей старше 10 лет в качестве монотерапии или в комбинации с инсулином. **Профилактика сахарного диабета 2 типа** у пациентов с предиабетом с дополнительными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа, у которых изменения образа жизни не позволили достичь адекватного гликемического контроля.

Способ применения и дозы: внутрь, доза и режим приема препарата, а также продолжительность применения устанавливаются лечащим врачом в зависимости от концентрации глюкозы в плазме крови. **Монотерапия** или в составе комбинированной терапии с другими гипогликемическими средствами для перорального применения. Рекомендуемая начальная доза препаратов Сιοфор 500 и Сιοфор 850 составляет 2–3 таблетки в сутки, препарата Сιοфор 1000 – 1/2 таблетки в сутки во время или после еды. Через 10–15 дней после начала приема препарата возможно дальнейшее постепенное увеличение дозы в зависимости от концентрации глюкозы в плазме крови до средней суточной дозы 3–4 таблетки препарата Сιοфор 500, 2–3 таблетки препарата Сιοфор 850 мг или 2 таблетки препарата Сιοфор 1000. Максимальная суточная доза метформина составляет 3000 мг, разделенная на 3 приема. Дети и подростки до 18 лет. Обычная начальная доза составляет 500 мг 1 раз в сутки после или во время приема пищи. Через 10–15 дней дозу необходимо скорректировать на основании концентрации глюкозы крови. Максимальная суточная доза составляет 2000 мг, разделенная на 2–3 приема.

Противопоказания: гиперчувствительность к метформину или к любому из вспомогательных веществ; диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома; почечная недостаточность или нарушение функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина менее 30 мл/мин); острые состояния, протекающие с риском развития нарушения функции почек; дегидратация (при диарее, рвоте); тяжелые инфекционные заболевания, шок; клинически выраженные проявления острой или хронической сердечной недостаточности, которые могут приводить к развитию тканевой гипоксии (в том числе острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность с нестабильными показателями гемодинамики, дыхательная недостаточность, острый инфаркт миокарда); обширные хирургические операции и травмы, когда показано проведение инсулинотерапии; печеночная недостаточность, нарушение функции печени; хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем; лактоацидоз (в том числе и в анамнезе); применение в течение менее 48 ч до и в течение 48 ч после проведения радиоизотопных или рентгенологических исследований с введением йодсодержащего контрастного вещества; соблюдение гипохолерной диеты (менее 1000 ккал в сутки); детский возраст до 10 лет; беременность.

Ознакомьтесь с полной информацией о лекарственных препаратах Сιοфор® 500/850/1000, ИСПОЛЬЗУЯ QR-КОДЫ

Сιοфор® 500



Сιοфор® 850



Сιοфор® 1000



Отпускается по рецепту.

Информация для специалистов здравоохранения.

**БЕРЛИН-ХЕМИ
МЕНАРИНИ**

000 «Берлин-Хеми/А.Менарини», Россия,
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ
«Башня на Набережной», Блок Б, тел.: (495) 785-01-00, факс: (495)
785-01-01. <http://www.berlin-chemie.ru>

Если у Вас имеется информация о нежелательном явлении, пожалуйста, сообщите об этом на электронный адрес AE-BC-RU@berlin-chemie.com