





-  **Контроль гликемии**
(снижение уровня HbA1c до -1,1%)^{1,2}
-  **Улучшает функцию β-клеток**¹⁻³
-  **Не приводит к увеличению массы тела**¹⁻³
-  **Характеризуется низким риском развития гипогликемии**¹⁻³

ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА

Показания к применению препарата Агарта®: Для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа: в качестве монотерапии в случае неэффективности диетотерапии и физических упражнений при противопоказаниях или непереносимости метформина; в составе двухкомпонентной комбинированной терапии с метформином у пациентов с недостаточным гликемическим контролем, несмотря на максимально переносимую дозу метформина; с препаратами сульфонилмочевины у пациентов с недостаточным гликемическим контролем, несмотря на максимально переносимую дозу препаратов сульфонилмочевины, для которых метформин не показан или в случае его непереносимости; у пациентов с недостаточным гликемическим контролем, принимающих тиазолидинион; в составе тройной комбинированной терапии: в комбинации с препаратами сульфонилмочевины и метформином у пациентов с недостаточным гликемическим контролем при применении этих препаратов на фоне диетотерапии и физических упражнений. Вилдаглиптин показан к применению в комбинации с инсулином (с метформином или без него) у пациентов с недостаточным гликемическим контролем на стабильной дозе инсулина на фоне диеты и физических упражнений. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.

Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.

Обязательно ознакомьтесь с полной инструкцией по применению препарата.



Показания к применению препарата Агарта® Мет: Для лечения сахарного диабета 2 типа (в сочетании с диетотерапией и физическими упражнениями): при недостаточной эффективности монотерапии вилдаглиптином или метформином; у пациентов, ранее получавших комбинированную терапию вилдаглиптином и метформином в виде монопрепаратов; в комбинации с производными сульфонилмочевины (тройная комбинированная терапия) у пациентов, ранее получавших терапию производным сульфонилмочевины и метформином без достижения адекватного контроля гликемии; в тройной комбинированной терапии с инсулином у пациентов, ранее получавших инсулинотерапию в стабильной дозе и метформин без достижения адекватного контроля гликемии; в качестве начальной терапии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при недостаточной эффективности диетотерапии, физических упражнений и при необходимости улучшения контроля гликемии. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.



1. Инструкция Агарта® ЛП-№ 000266 от 04.06.2022



2. Инструкция Агарта® Мет ЛП-№002219 от 20.04.2023

3. Matthews DR, et al. Lancet 2019; 394: 1519–29



ГЕДЕОН РИХТЕР
Здоровье — наша миссия

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»

119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8

Тел.: +7 (495) 987-1880, GRFarma@g-richter.ru