


ЛИКВАТИРОЛ®

жидкая форма
левотироксина натрия¹

шаг 2 мкг¹

*Максимальная точность
и стабильный контроль
гипотиреоза^{1-4, **}*



 NIZHPHARM
GROUP

РАСЧЕТ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ ПРЕПАРАТА ЛИКВАТИРОЛ® (в мл)

$ВЕС (кг) \times коэффициент^* \times 0,05 (мл/мкг)$

$Доза Левотироксина (мкг)/20$

* КОЭФФИЦИЕНТЫ¹:

1,6-1,8 для пациентов от 18 до 55 лет без ССЗ

0,9 для пациентов старше 55 лет или пациентов с ССЗ

вЕС	МКГ	МЛ
50	80	4
52	83	4,2
54	86	4,3
56	90	4,5
58	93	4,6

вЕС	МКГ	МЛ
60	96	4,8
62	99	5,0
64	102	5,1
66	106	5,3
68	109	5,4

вЕС	МКГ	МЛ
70	112	5,6
72	115	5,8
74	118	5,9
76	122	6,1
78	125	6,2

вЕС	МКГ	МЛ
80	128	6,4
82	131	6,6
84	134	6,7
86	138	6,9
88	141	7,0

вЕС	МКГ	МЛ
90	144	7,2
92	147	7,4
94	150	7,5
96	154	7,7
98	157	7,8

вЕС	МКГ	МЛ
100	160	8,0
102	163	8,2
104	166	8,3
106	170	8,5
108	173	8,6

Способ применения: суточную дозу препарата Ликватирол принимают внутрь утром натощак. Грудным детям и детям до 3 лет суточную дозу препарата дают в один прием до первого кормления. Для точного отмеривания дозы прилагается шприц объемом 5 мл с градуировкой 0,1 мл и адаптером для шприца.^{1,**}

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

** Согласно данным ГРЛС (<https://grls.rosminzdrav.ru/>) и инструкции по медицинскому применению препаратов с МНН «Левотироксин натрия» по состоянию на 29.03.2024 года препарат «Ликватирол®» позволяет осуществлять дозировку с наименьшим шагом (2 мкг действующего вещества) за счет жидкой формы.

1. ОХЛП Ликватирол®, ЛП-№(004762)-(PF-RU). <https://portal.eaunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/Pages/CardView.aspx?documentId=63a43b42fb44f154421a2837&codeId=P.MM.01> (дата обращения 18.03.2024)
2. Negro R. et al. Levothyroxine liquid solution versus tablet for replacement treatment in hypothyroid patients. Endocr Pract. 2014 Sep;20(9):901-6.
3. Carpellini C. et al. Thyroid hormonal profile in elderly patients treated with two different levothyroxine formulations: a single institute survey. Eur Geriatr Med (2014) 5:382-5.
4. Seng Yue C., Scarsi C. et al. Proton Pump Inhibitors Do Not Affect the Bioavailability of a Novel Liquid Formulation of Levothyroxine. Endocr Pract. 2024 Jun; 30 (6): 513-520.

АО «Нижфарм», 603105,
РФ, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7
Тел: +7 (831) 278-80-88, +7 (800) 250-50-00.
Факс: +7 (831) 240-72-13.
www.nizhpharm.ru

Дата выпуска: апрель 2025;
POS-20270422-0771. Реклама.
Информация предназначена
для медицинских
и фармацевтических работников.

