



СИОФОР®

МЕТФОРМИНА
ГИДРОХЛОРИД 500, 850, 1000 мг

КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ИНСУЛИНО- РЕЗИСТЕНТНОСТИ^{1,2}

ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
И ПРЕДИАБЕТЕ¹

► В моно- и комбинированной терапии
сахарного диабета 2 типа
у взрослых и детей с 10 лет¹

► Не стимулирует секрецию инсулина
и не приводит к гипогликемии^{1*}

► Благоприятно воздействует
на липидный обмен¹



Препарат
выбора²
при СД 2 типа № 1

1. Общая характеристика лекарственного препарата Сиофор® 500, Сиофор® 850, Сиофор® 1000.

2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. и соавт. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 11-й выпуск. Сахарный диабет. 2023;26(2S):1-157. <https://doi.org/10.14341/DM13042>

* В монотерапии. ** У пациентов с хронической болезнью почек или сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска рекомендуется персонализированный подход.

Базовая информация о препарате Сиофор® 500/850/1000 от 11.07.2024:
Действующее вещество: метформин (в виде гидрохлорида), в дозе 500 мг, 850 мг и 1000 мг. Показания к применению: сахарный диабет 2 типа, особенно у пациентов с избыточной массой тела, для адекватного контроля концентрации глюкозы в плазме крови при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок; у взрослых в качестве монотерапии или в составе комбинированной терапии с другими пероральными гипогликемическими средствами и инсулином; у детей старше 10 лет в качестве монотерапии или в комбинации с инсулином. Профилактика сахарного диабета 2 типа у пациентов с преддиабетом с дополнительными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа, у которых изменения образа жизни не позволяют достичь адекватного гликемического контроля.

Способ применения и дозы: внутрь; доза и режим приема препарата, а также продолжительность лечения устанавливаются лечащим врачом в зависимости от концентрации глюкозы в плазме крови. Взрослые. Монотерапия или в составе комбинированной терапии с другими гипогликемическими средствами для перорального применения. Рекомендуемая начальная доза препаратов Сиофор 500 и Сиофор 850 составляет 2–3 таблетки в сутки, препарата Сиофор 1000 – 1/2 таблетки в сутки во время или после еды. Через 10–15 дней после начала приема препарата возможно дальнейшее постепенное увеличение дозы в зависимости от концентрации глюкозы в плазме крови до средней суточной дозы 3–4 таблетки препарата Сиофор 500, 2–3 таблетки препарата Сиофор 850 или 2 таблетки препарата Сиофор 1000. Максимальная суточная доза метформина составляет 3000 мг, разделенная на 3 приема. Дети и подростки до 18 лет. Обычная начальная доза составляет 500 мг 1 раз в сутки после или во время приема пищи. Через 10–15 дней дозу необходимо скорректировать на основании концентрации глюкозы крови. Максимальная суточная доза составляет 2000 мг, разделенная на 2–3 приема. Противопоказания: гиперчувствительность к метформину или к любому из вспомогательных веществ; диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома; почечная недостаточность или нарушение функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина менее 30 мл/мин); острые состояния, протекающие с риском развития нарушения функции почек: дегидратация (при диарее, рвоте), тяжелые инфекционные заболевания, шок; клинически выраженные проявления дыхательной недостаточности, острый инфаркт миокарда; обширные хирургические операции и травмы, когда показано проведение инсулинотерапии; почечная недостаточность, нарушение функции печени; хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем; лактоацидоз (в том числе и в анамнезе); применение в течение менее 48 ч до и в течение 48 ч после проведения радиоизотопных или рентгенологических исследований с введением йодсодержащего контрастного вещества; соблюдение гипокалорийной диеты (менее 1000 ккал в сутки); детский возраст до 10 лет; беременность.

Ознакомьтесь
с полной информацией
о лекарственных препаратах
Сиофор® 500/850/1000,
используя QR-коды



Отпускается по рецепту.

Информация для специалистов
здравоохранения.

**БЕРЛИН-ХЕМИ
МЕНАРИН**

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарин», Россия,
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ
«Башня на Набережной», Блок Б, тел.: (495) 785-01-00, факс: (495)
785-01-01. <http://www.berlin-chemie.ru>

Если у Вас имеется информация о нежелательном явлении, пожалуйста,
сообщите об этом на электронный адрес AE-BC-RU@berlin-chemie.com